Île-du-Prince-Édouard
CANADA
Santé et Mieux-être

Protégez votre bébé de la coqueluche
Information pour les parents

Santé Î. –P.-É.

Qu'est-ce que la coqueluche?
La coqueluche est une infection grave des poumons et des voies respiratoires causée par une bactérie. Cette bactérie peut se trouver dans le nez ou la gorge de personnes de tout âge et se transmet facilement par la toux, les éternuements et le contact humain.

Quels sont les symptômes de la coqueluche?
Les premiers symptômes de la coqueluche sont semblables à ceux du rhume : nez qui coule, légère fièvre, toux et éternuements. En moins d'une ou deux semaines, la toux empire et se transforme en quintes qui peuvent être ponctuées d'un son rauque. Le mucus ainsi produit peut induire des vomissements ou des haut-le-cœur, et il est parfois difficile de respirer. La toux dure plusieurs semaines et est souvent pire la nuit.

Est-ce que la coqueluche est fréquente?
Tous les trois ou quatre ans, il y a une flambée de la coqueluche. Depuis quelques années, les cas de coqueluche sont à la hausse chez les nourrissons en Amérique du Nord. Plusieurs nourrissons sont décédés de cette maladie, tandis que d'autres ont dû être hospitalisés et ont été très malades.

Pourquoi les cas de coqueluche sont-ils à la hausse?
Même si bien des gens ont été immunisés contre la coqueluche pendant leur enfance, l'immunisation devient moins efficace au fil des ans. Les adultes sont donc plus susceptibles de développer l'infection et de la transmettre aux autres. Les gens qui attrapent la coqueluche ne développent pas une immunisation à vie; il est donc possible de l'avoir plus d'une fois.

Octobre 2015

Pourquoi la coqueluche est-elle dangereuse pour mon bébé?
La coqueluche peut mettre la vie des bébés et des jeunes enfants en danger. Les bébés ne peuvent pas recevoir le vaccin à la naissance et ne sont protégés qu'à l'âge de 18 mois, lorsqu'ils ont reçu quatre doses. Les jeunes enfants, surtout les nourrissons, peuvent devenir très malades et présenter de graves complications comme la pneumonie, des convulsions, de la difficulté à respirer et des lésions cérébrales permanentes. La coqueluche peut causer la mort chez les nourrissons, même s'ils reçoivent des antibiotiques ou des soins dans un hôpital.

Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon bébé de la coqueluche?
La meilleure façon de protéger votre bébé de la coqueluche est de vous assurer que les personnes qui en prennent soin soient immunisées. Avant la naissance de votre bébé, veillez à ce que toutes les personnes qui seront en contact direct avec votre bébé soient immunisées, y compris le père de l'enfant, ses frères et sœurs et ses grands-parents. Ils peuvent prendre rendez-vous auprès d'un bureau de services infirmiers de santé publique pour recevoir le vaccin.

Après la naissance de votre bébé, on vous offrira ce vaccin à l'hôpital. Le vaccin est sécuritaire pour les mères qui allaitent. Votre bébé sera moins susceptible de développer la coqueluche si les gens qui l'entourent sont immunisés.

À quel moment mon bébé recevra-t-il son vaccin contre la coqueluche?
Votre bébé recevra un vaccin contre la coqueluche lors de ses visites à une clinique de santé publique à l'âge de 2, 4 et 6 mois, puis une injection de rappel à 18 mois. C'est à ce moment-là que votre bébé sera le mieux protégé contre la coqueluche.